

एक शिशु के लिए सीपीआर

1

शिशु की और शिशु की एबीसी की जाँच करें (वायुमार्ग, श्वास प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण)।

यदि शिशु प्रतिक्रिया न करे और सामान्य रूप से साँस नहीं ले रहा है, तो EMS/9-1-1 पर कॉल करें और एईडी प्राप्त करें या किसी और से ऐसा करवाएँ।



2

दोनों उंगलियों को शिशु की छाती के मध्य में रखें।

छाती को 30 बार दबाएँ करें: गहरी और नियमित गति से दाब दें।



3

सिर को पीछे झुकाकर और ठुड्डी को उठाकर वायुमार्ग खोलें। शिशु के मुँह और नाक के ऊपर अपना बैरियर उपकरण रखें। 2 सांस दें।



4

छाती को 30 बार दबाने और 2 सांस देने के चक्र को दोहराते रहें। एईडी आने या अधिक उन्नत देखभाल होने तक सीपीआर को जारी रखें।



इस पोस्टर की जानकारी औपचारिक प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर प्रशिक्षण की जगह नहीं लेती है।

अपने क्षेत्र में एक रेड क्रॉस फर्स्ट एड कोर्स का पता लगाने के लिए हमसे संपर्क करें और हमारी प्राथमिक चिकित्सा ऐप मुफ्त डाउनलोड करें:

myrc.redcross.ca | [1.877.356.3226](tel:1.877.356.3226) | redcross.ca/apps

